

Recomendaciones

Mantener reposo relativo y protegido de la luz solar y aplicar protector solar cuando el médico lo indique.

En caso de sangramiento, comprima la zona con una gasa estéril, si este es abundante, debe consultar en el centro asistencial más cercano a su domicilio.

La cirugía no cumple ningún objetivo funcional si no es acompañada de terapia kinésica, la que se iniciará entre la 3era y 4ta semana después de la cirugía.

Controles postoperatorios

El retiro de la sutura se realizará la semana siguiente de la cirugía.

Al momento del alta médica se entregará una hora de control con el cirujano.

*"Yo te miro, yo te miro
sin cansarme de mirar
y que lindo niño veo a
tus ojos asomar"*

*Extracto de "Caricia"
-Gabriela Mistral*

Contacto

32 2190 731

32 2190 735

fisuradosfricke@gmail.com

Indicaciones postoperatorias

Cuidados para el cierre de labio

Nombre

Unidad de Fisura Labio Palatino

HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE

Evolución postoperatoria

Luego del despertar anestésico y según la indicación médica, el niño reiniciará su alimentación igual como antes de operarse, mediante lactancia materna o mamadera.

Se podrá retirar el acceso venoso y se deberá mantener al bebé con inmovilizadores de codo para impedir que se toque y dañe la zona operada.

Curación

Es importante siempre tener un buen lavado de manos.

Realizar la curación en la herida operatoria mínimo 4 veces al día y cada vez que sea necesario, con cotonitos humedecidos en agua hervida fría, hasta que quede limpia, sin secreciones ni sangre seca.

Luego de la curación, aplique ungüento dermabiótico en la herida operatoria 4 veces en el día, hasta el control post quirúrgico

Inmovilización

Coloque en los brazos de su niño(a) manguillas de forma permanente, para evitar que el niño o niña introduzca sus manos y/u objetos dentro de su boca. Esto evita el retiro de puntos involuntario, sangramiento e infecciones.

Mantenga las manguillas hasta el primer control y consulte al médico si es necesario seguir usándolas



Cuidados en casa

Realiza reposo

Alimentación

Medicación